

1. 脳梗塞急性期

1-15. 急性期頸部頸動脈血行再建術
(血管形成術/ステント留置術)

推 奨

脳梗塞急性期に頸部頸動脈血行再建術(血管形成術/ステント留置術)を行うことには、十分な科学的根拠はない(グレードC1)。

●エビデンス

急性期の頸部頸動脈血管形成術やステント留置術についての報告は症例集積研究のエビデンスレベルにとどまっており¹⁻³⁾、勧告を行うための十分な資料がない(III)。

引用文献

- 1) Jovin TG, Gupta R, Uchino K, Jungreis CA, Wechsler LR, Hammer MD, et al. Emergent stenting of extracranial internal carotid artery occlusion in acute stroke has a high revascularization rate. *Stroke* 2005 ; 36 : 2426-2430
- 2) Geisler BS, Rother J, Kucinski T, Zeumer H, Eckert B. Emergency carotid artery stenting in persistent hemodynamic deficit associated with severe carotid stenosis. *AJNR Am J Neuroradiol* 2005 ; 26 : 549-552
- 3) Zaidat OO, Alexander MJ, Suarez JI, Tarr RW, Selman WR, Enterline DS, et al. Early carotid artery stenting and angioplasty in patients with acute ischemic stroke. *Neurosurgery* 2004 ; 55 : 1237-1243