

表3-2 旧版 NIH Stroke Scale(NIHSS)(1994)

項目	スコア		番号
意識レベル	0=覚醒 1=簡単な刺激で覚醒	2=反復刺激や強い刺激で覚醒 3=(反射的肢位以外は)無反応	1A
意識レベル 質問	0=2問とも正答 1=1問に正答	2=2問とも誤答	1B
意識レベル 従命	0=両方の指示動作が正確に行える 1=片方の指示動作のみ正確に行える	2=いずれの指示動作も行えない	1C
注 視	0=正常 1=部分的注視麻痺	2=完全注視麻痺	2
視 野	0=視野欠損なし 1=部分的半盲(四分盲を含む)	2=完全半盲(同名半盲を含む) 3=両側性半盲(皮質盲を含む全盲)	3
顔面麻痺	0=正常 1=軽度の麻痺	2=部分的麻痺 3=完全麻痺	4
左 腕	0=下垂なし(10秒間保持可能) 1=10秒以内に下垂 2=重力に抗するが10秒以内に落下	3=重力に抗する動きがみられない 4=全く動きがみられない	5a
右 腕	0=下垂なし(10秒間保持可能) 1=10秒以内に下垂 2=重力に抗するが10秒以内に落下	3=重力に抗する動きがみられない 4=全く動きがみられない	5b
左 脚	0=下垂なし(5秒間保持可能) 1=5秒以内に下垂 2=重力に抗するが5秒以内に落下	3=重力に抗する動きがみられない 4=全く動きがみられない	6a
右 脚	0=下垂なし(5秒間保持可能) 1=5秒以内に下垂 2=重力に抗するが5秒以内に落下	3=重力に抗する動きがみられない 4=全く動きがみられない	6b
運動失調	0=なし 1=1肢にあり	2=2肢にあり	7
感 覚	0=正常 1=軽度~中等度の障害	2=高度の障害	8
言 語	0=正常 1=軽度の失語	2=高度の失語 3=無言または全失語	9
構音障害	0=正常 1=軽度~中等度の障害	2=高度の障害	10
消去/無視	0=正常 1=軽度~中等度の障害	2=高度の障害	11

合計点=  /42

(Lyden P, Brott T, Tilley B, Welch KM, Mascha EJ, Levine S, et al. Improved reliability of the NIH Stroke Scale using video training. NINDS TPA Stroke Study Group. Stroke 1994 ; 25 : 2220-2226)