

日本脳卒中学会・脳卒中感情障害（うつ・情動障害）スケール同時評価表

Japan Stroke Scale (JSS-DE)

[1] 気分

- A：気分爽快やうつ気分はなく、普通にみえる
 B：気分がふさいでいる様子がある
 C：気分が沈む、寂しい、悲しいという明らかな訴えや素ぶりがある

	うつ	情動障害
<input type="checkbox"/>	A = - 0.98	A = - 0.93
<input type="checkbox"/>	B = - 0.54	B = - 0.68
<input type="checkbox"/>	C = 1.52	C = 1.61

[2] 罪責感、絶望感、悲観的思考、自殺念慮

- A：特に自分を責める気持ちはなく、将来に希望がある
 B：自分は価値がない人間だと思い、将来に希望をなくしている
 C：明らかな罪責感をもつ（過去に過ちをした、罪深い行為をしたなどと考える）ないしは死にたいという気持ちを持つ

<input type="checkbox"/>	A = - 2.32	
<input type="checkbox"/>	B = - 0.88	
<input type="checkbox"/>	C = 3.19	

[3] 日常活動（仕事、趣味、娯楽）への興味、楽しみ

- A：仕事ないしは趣味・娯楽に対して、生き生きと取り組める
 B：仕事ないしは趣味・娯楽に対して、気乗りがしない
 C：仕事ないしは趣味・娯楽に対して完全に興味を喪失し、活動に取り組まない

<input type="checkbox"/>	A = - 1.17	
<input type="checkbox"/>	B = - 0.94	
<input type="checkbox"/>	C = 2.11	

[4] 精神運動抑制または思考制止

- A：十分な活気があり自発的な会話や活動が普通にできる
 B：やや生気や意欲に欠け、集中力も鈍い
 C：全く無気力で、ほんやりしている

<input type="checkbox"/>	A = - 0.84	
<input type="checkbox"/>	B = - 0.53	
<input type="checkbox"/>	C = 1.37	

[5] 不安・焦燥

- A：不安感やいらいら感はない
 B：不安感やいらいら感が認められる
 C：いらいら感をコントロールできず、落ち着きない動作・行動がしばしばみられる

<input type="checkbox"/>	A = - 1.11	A = - 2.04
<input type="checkbox"/>	B = - 0.64	B = - 0.44
<input type="checkbox"/>	C = 1.75	C = 2.47

[6] 睡眠障害

- A：よく眠れる
 B：よく眠れない（入眠障害、熟眠障害ないしは早朝覚醒）
 C：夜間の不穏（せん妄をふくむ）がある
 付加情報：Bを選択した場合、以下のうち認められるものにする。複数選択可。
 入眠障害（ ） 途中覚醒・熟眠障害（ ） 早朝覚醒（ ）

<input type="checkbox"/>	A = - 1.83	A = - 1.72
<input type="checkbox"/>	B = - 0.64	B = - 0.98
<input type="checkbox"/>	C = 2.47	C = 2.70

[7] 表情

- A：表情は豊かで、明るい
 B：表情が乏しく、暗い
 C：不適切な感情表現（情動失禁など）がある

<input type="checkbox"/>	A = - 0.52	A = - 0.80
<input type="checkbox"/>	B = - 0.79	B = - 0.45
<input type="checkbox"/>	C = 1.31	C = 1.25

[8] 日常生活動作・行動（入浴・着替え・洗面・娯楽など）に関する自発性と意欲の低下

- A：自発的に活動し、通常在意欲がある
 B：日常生活動作に働きかけが必要で、意欲に欠ける
 C：働きかけても活動せず、まったく無気力である

<input type="checkbox"/>		A = - 1.05
<input type="checkbox"/>		B = - 0.67
<input type="checkbox"/>		C = 1.72

[9] 脱抑制行動（易怒性，性的逸脱行動）

- A：感情や異常な行動を抑制できる
- B：悪態や乱暴な言葉，または軽い性的な言動が見られる（エロチックな発言や体にさわるなど）
- C：異常で明らかな怒りや逸脱行為が見られる（物を投げる，つねる，たたく，ひっかく，蹴る，嘔みつく，つばを吐く，叫ぶ，服をかってに脱ぐなどの行動）

うつ 情動障害

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A = - 5.53
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B = - 0.78
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C = 6.31

[10] 病態・治療に対する対応

- A：自分の身体の状態を認識し，その治療に前向きである
- B：自分の身体の状態を認識しているが，治療への積極性がない
- C：自分の身体の状態を認識していない

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A = - 1.18
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B = - 0.29
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C = 1.47

[11] 対人関係

- A：家族やスタッフとの交流は良好である
- B：家族やスタッフとのかかわりに消極的で，関心が薄い
- C：周囲との交流はほとんどなく，人との接触到拒否的である

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A = - 1.30
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B = - 0.58
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C = 1.89

脳卒中うつスケール	
Total	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
Constant	+9.50
<hr style="border: 1px solid black;"/>	
Total score =	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>

脳卒中情動障害スケール	
Total	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
Constant	+14.00
<hr style="border: 1px solid black;"/>	
Total score =	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>